

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- 1. Przechowywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;**
- 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;**
- 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;**
- 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;**
- 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.**

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W ŻAGANIU INFORMACJA DLA HODOWCÓW – PTASIA GRYPY (HPAI)

HODOWCO !

Jeżeli utrzymujesz drób w chowie przydomowym pamiętaj:

- zgłoś fakt posiadania drobiu lub innych ptaków powiatowemu lekarzowi weterynarii z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych;
- sporządź rejestr posiadanego drobiu lub innych ptaków i dokonuj codziennego przeglądu stada wraz z aktualizacją danych;
- karm drób lub inne ptaki w pomieszczeniach zamkniętych,
- do których nie mają dostępu dzikie ptaki;
- nie wykorzystuj do pojenia drobiu lub ptaków wody ze zbiorników, do której mają dostęp dzikie ptaki;
- trzymaj drób lub inne ptaki z dala od zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki;
- utrzymuj drób z dala od ptaków dzikich (z wyłączeniem kaczek i gęsi);
- zadbaj o to, aby gniazda drobiu znajdowały się wewnątrz budynku
- nie wnoś na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków ani tusz ptaków łownych;
- zabezpiecz paszę i ściółkę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków;
- jeżeli jesteś myśliwym, nie zajmuj się obsługą drobiu lub innych ptaków przez 48 h od ostatniego polowania;
- obserwuj stan zdrowia ptaków, jeżeli zauważasz niepokojące objawy u drobiu lub ptaków poinformuj lekarza weterynarii !!!

Jeżeli utrzymujesz drób w celach komercyjnych, oprócz spełniania powyższych wymogów pamiętaj:

- zadbaj o wyposażenie gospodarstwa w odpowiednią liczbę mat dezynfekcyjnych (lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję obuwia) przed wejściami i wyjściami z budynków gospodarskich oraz niecek (lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów) przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa;
- wchodząc do budynku, w którym utrzymywany jest drób stosuj odzież ochronną i obuwie ochronne (czyszczone i dezynfekowane) przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku;
- czyść i odkażaj sprzęt oraz narzędzia przed każdym ich użyciem, a jeżeli używasz ich wyłącznie w danym budynku wykonuj to co najmniej raz dziennie;
- prowadź i przechowuj przez rok dokumentację dotyczącą zakupu, przejęcia i zużycia środków odkażających, terminu przeprowadzenia deratyzacji i dezynfekcji oraz daty padnięcia zwierząt wraz z ilością zgłoszonych padłych ptaków;

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W ŻAGANIU INFORMACJA DLA HODOWCÓW – PTASIA GRYPY (HPAI)

- **wprowadź metody zabezpieczające kurniki, miejsca przechowywania paszy i ściółki przed dostępem dzikich ptaków oraz metody przeprowadzania deratyzacji i dezynfekcji;**
- **prowadź rejestr środków transportu do przewozu drobiu, jaj, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz wejść osób do budynków, w których utrzymywany jest drób;**
- **wyposaż swoje gospodarstwo w kontener lub pomieszczenie do przetrzymywania zwłok padłego drobiu, zabezpieczając je przed dostępem gryzoni, zwierząt domowych i dzikich;**
- **usuwaj z kurników drób padły nie rzadziej niż raz dziennie;**
- **zadbaj o odpowiednią ilość środków do dezynfekcji jak również właściwe utrzymanie mat i niecek, tak aby wystarczyło na przeprowadzenie skutecznej i bieżącej dezynfekcji co najmniej przez tydzień;**
- **zabezpiecz zbiorniki wodne znajdujące się na terenie gospodarstwa przed dostępem dzikich ptaków;**
- **zadbaj o czystość i porządek wokół budynków inwentarskich oraz miejsc, w których przechowujesz paszę i ściółkę (usuwaj pozostałości pasz i ściółki, wykaszaj roślinność);**
- **wydziel w gospodarstwie miejsce do składowania środków odkażających; obornika, paszy i ściółki oraz weterynaryjnych produktów leczniczych i zabezpiecz je przed dostępem osób nieupoważnionych;**

Jeżeli utrzymujesz więcej niż 350 sztuk drobiu średniorocznie sporządź plan bioasekuracji, dostosowany do profilu produkcji gospodarstwa, w którym uwzględnić należy:

- **podział na strefy „czyste” i „brudne” dla pracowników obsługujących drób,**
- **sposób wprowadzania do gospodarstwa drobiu, pasz, ściółki, materiałów pomocniczych a także sprzętu i urządzeń wykorzystywanych do obsługi drobiu,**
- **procedury dotyczące czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, wyposażenia oraz higieny osób zajmujących się drobiem, metody zwalczania szkodników,**

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W ŻAGANIU INFORMACJA DLA HODOWCÓW – PTASIA GRYPA (HPAI)

- **rozwiązania w celu rozdzielenia poszczególnych stad drobiu oraz uniemożliwienie kontaktu z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego;**
- **Pamiętaj, wysoce zjadliwa grypa ptaków to zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są wszystkie gatunki drobiu i wiele gatunków ptaków dzikich. Wirus ptasiej grypy powoduje bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. A objawy choroby są następujące:**
 - **zwiększona śmiertelność,**
 - **spadek pobierania paszy i wody,**
 - **objawy nerwowe tj. drgawki, skręt szyi, paraliż nóg, skrzydeł lub niezbornych ruchów,**
 - **duszności,**
 - **sinice i wybroczyny,**
 - **biegunki,**
 - **nagły spadek nieśności.**

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W ŻAGANIU

lek. wet. Paweł Gronczewski

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU PRYZAGRODOWEGO



W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Polsce oraz województwie lubuskim związanej z występowaniem ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy (HPAI) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu zaleca:

- przygotować pomieszczenia (kurniki, inne zamknięte obiekty budowlane lub miejsca w gospodarstwie) dla drobiu lub innych ptaków pozwalające na całodobowe utrzymywanie ich w odosobnieniu oraz jak najszybsze, w miarę możliwości, utrzymywanie ptaków bez wypuszczania na zewnątrz,
- karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczoną dla drobiu;
- powstrzymanie się od gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych.

Jednocześnie informuję, że w przypadku wystąpienia zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu żagańskiego, **utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu przez całą dobę, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie stanie się obowiązkiem !!!**

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARI
W ŻAGANIU

lek. wet. Paweł Gronczewski


W związku z wysokim ryzykiem wystąpienia grypy ptaków Powiatowi Lekarze Weterynarii przypominają:

- na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących.
- zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową (źródłem zakażenia drobiu domowego jest kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, kontakt z zanieczyszczoną paszą, wodą, nawozem, ściółką, sprzętem i środkami transportu).
- posiadacz drobiu powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększona śmiertelność; spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów; duszność; sinica i wybroczyny; biegunka; nagły spadek nieśności.
- dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich powinni zgłaszać powiatowemu lekarzowi weterynarii albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.
- obowiązek przestrzegania zasad bioasekuracji dotyczy wszystkich posiadaczy drobiu!

Więcej informacji na stronie GIW pod linkiem: <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow>

**Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Żarach - Anna Bożek**

**Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Żaganiu - Andrzej Olczak**



Więcej informacji na www.krd-ig.com.pl

GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?

<p>1</p> <p>Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!</p>	<p>2</p> <p>Pod żadnym pozorem nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione.</p>	<p>3</p> <p>Pamiętaj o matkach dezynfekcyjnych i regularnie je nasycaj aktywnym środkiem odkażającym.</p>
<p>4</p> <p>Wprowadź zakaz wstępu na fermę osobom nieposiadającym kapturki z innymi płaszczykami (np. właścicielom przydomowych kurczaków, czy myszów).</p>	<p>5</p> <p>Pamiętaj, żeby zawsze zakładać ochraniacz ochronny przed wejściem do kurczaka i zwrócić jej każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.</p>	<p>6</p> <p>Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z odkażonymi kołami.</p>
<p>7</p> <p>Zadbaj o zabezpieczenie ściółki.</p>	<p>8</p> <p>Pamiętaj o dezynfekcji ściółki przed wnieшением do kurczaka.</p>	<p>9</p> <p>Zadbaj o izolację każdego z kurczaków, a także osobne żywienie i narzędzia.</p>
<p>10</p> <p>Przewód rejestr działań takich jak: oczyszczanie, odkażanie, dezynfekcja i deratyzacja.</p>	<p>11</p> <p>Przejmiesz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - trzymaj je w zamknięciu.</p>	<p>12</p> <p>Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek nieśności oraz objawy nerwowe (porażenie, skręty szyi, drgawki, biegunka, duszność) - NIE ZWLEKAJ - zawiadom powiatowego lekarza weterynarii!</p>